

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/plyn-do-dezynfekcji-ahd-1000-1l-p-33333.html>



PŁYN DO DEZYNFEKCJI AHD 1000 1L

Cena brutto	47,09 zł
Cena netto	38,28 zł
Numer katalogowy	AC100137
Kod producenta	AC100137
Kod EAN	5902340982112

Opis produktu

AHD 2000

Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skóry i pola zabiegowego.

Charakterystyka produktu:

- wykazuje działanie natychmiastowe
- wykazuje działanie przedłużone (powyżej 3 godzin) potwierdzone badaniami
- ma szerokie spektrum działania; działa bakteriobójczo na bakterie Gram (+) i Gram (-) (w tym na Tbc), grzybobójczo; wykazuje pełne działanie wirusobójcze wg DVV (w tym HIV, HBV, HCV)
- wykazuje skuteczne działanie nawet w obecności zanieczyszczeń organicznych, jak np. krew, albuminy
- działa bardzo delikatnie na skórę; jest dobrze tolerowany nawet przy częstym stosowaniu przez osoby o wrażliwej skórze i skłonnościach do alergii
- zawiera etanol i substancje pielęgnujące skórę
- dodatek substancji nawilżających zapobiega wysuszeniu skóry
- nie utrudnia gojenia się ran
- ułatwia zakładanie i przyleganie rękawic ochronnych
- nie pozostawia na skórze substancji chemicznych obciążających i drażniących skórę
- preparat ma przyjemny, ulotny zapach
- butelki o pojemności 1 litra dostosowane są do typowych ramieniowych dozowników ściennych

Skład chemiczny:

100 g preparatu zawiera: etanol - 79,9 g, butan-2-on - 0,75 g, olejki zapachowe - 0,02 g, stabilizator - 0,63 g, woda oczyszczona ad 100 g

Stosowanie:

HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK - na uprzednio dokładnie umyte i wytarte jednorazowym ręcznikiem ręce, nanieść 3 ml preparatu. Dokładnie wcierać w skórę rąk, aż do wyschnięcia (ok. 30 sek.). Preparat stosuje się nierozcieńczony!
CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK - na dokładnie umyte, a następnie wytarte dłonie i przedramiona nanieść 5 ml preparatu i dokładnie wcierać, aż do całkowitego wyschnięcia preparatu, zwracając szczególną uwagę na czubki palców i obrąbek naskórkowy paznokcia - zabieg powinien trwać ok. 1,5 min. Zabieg należy wykonać dwukrotnie. Preparat należy stosować nierozcieńczony!
DEZYNFEKCJA SKÓRY I POLA ZABIEGOWEGO -dezynfekowaną powierzchnię skóry pacjenta zwilżyć dokładnie preparatem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Przed iniekcjami, pobieraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą, zmianą opatrunków, przy zdejmowaniu szwów - odczekać minimum 15 sek. Przed operacjami i punkcjami - odczekać 1 min. Czynność należy wykonać dwukrotnie. Dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe (np. czoło) - odczekać 10 min. Przy stosowaniu aparatury elektrycznej odczekać, aż preparat całkowicie wyschnie. Obłożenia chirurgiczne i folie nakładać na skórę po całkowitym wyschnięciu preparatu.

Akceptowany przez wszystkie sanepidy.

Dystrybutor MEDILAB, producent Lysoform GmbH Niemcy

Pojemność: 1l